on n'a $\sum_k g_k y_k = 0$ que si $g_k = 0$ pour chaque k . On doit seulement prouver que $g_k \in \mathfrak{G}$, c'est-à-dire que l'ordre de chaque g_k est fini. Or ceci résulte sans peine par récurrence des équations (4), en tenant compte des conditions $b_{kk} > 0$, $b_{ik} = 0$ pour $i > k$.

V. Soit $m \in \mathfrak{G}$, $m > 0$. Supposons que le groupe $\mathfrak{G}$ soit tel que $mg = 0$ pour chaque $g \in \mathfrak{G}$. Alors la structure du groupe $B^n(\mathfrak{G})$ est complètement déterminée par celle des trois groupes $\mathfrak{G}$, $B^n(\mathfrak{G}_m)$ et $B^{n-1}(\mathfrak{G}_m)$, où $\mathfrak{G}_m$ désigne le groupe additif des nombres entiers réduits mod. m . En effet, si le groupe $\mathfrak{G}$ jouit de la propriété énoncée, on voit sans peine que les théorèmes I, II et III restent vrais (avec la démonstration essentiellement la même) en remplaçant $\mathfrak{G}$ par $\mathfrak{G}_m$ ¹⁾.

¹⁾ On doit remplacer $\mathfrak{G}$ par $\mathfrak{G}_m$ aussi dans la définition du groupe $B_1^n(\mathfrak{G})$.

Zum Diagonalverfahren Cantors.

Von

A. Fraenkel (Jerusalem).

Wenn das erste und einzige mathematische Journal, das ganz der Mengenlehre und ihren Anwendungen gewidmet ist und auf dessen bisherige Geschichte die Mathematiker Polens mit berechtigtem Stolz blicken können, nach kurzer Zeit das Jubiläum des 25. Bandes feiert, so ist das vielleicht ein passender Anlaß, neben neuen Forschungen auch eine allgemeine und prinzipielle Betrachtung vorzulegen. Besonders wenn das behandelte Problem dasjenige ist, das von den meisten Mengentheoretikern und von fast allen Gegnern der Mengenlehre als der springende Punkt beim Aufbau der Mengenlehre und der Begründung des Aktual-Unendlichen betrachtet wird: das *Diagonalverfahren*, wie es Cantor zum Beweis der Ungleichung $2^m > m$ (Mächtigkeit der Potenzmenge), speziell also der Nichtabzählbarkeit des Kontinuums verwendet hat¹⁾.

Gegen das Diagonalverfahren sind in den letzten Jahren eine Reihe von Angriffen gemacht worden, die es als bedeutungslos oder unbegründet hinstellen und damit (ich glaube: mit richtiger Konsequenz) die Mengenlehre in ihren Grundfesten erschüttert erklären. Unter den Angreifern befinden sich solche, über die man nicht wohl schweigend zur Tagesordnung übergehen kann, wie z. B. der auch erkenntnistheoretisch mit Erfolg hervorgetretene

¹⁾ Es genügt auf Cantors Arbeit *Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre* (Jahresb. Deutschen Math. Ver. 1 [1892], 75–78; Gesammelte Abhandlungen [Berlin 1932], 278–270) zu verweisen und von seiner Arbeit von 1874 abzusehen, ebenso von den späteren Anwendungen des Diagonalverfahrens, besonders durch die Herren Zermelo und Sierpiński.

bekannte Physiker der Harvard University P. W. Bridgman¹⁾. Speziell dieser Angriff, der nicht einfach als „intuitionistische Kritik“ bezeichnet werden kann, bildet den Anlaß für die folgenden Zeilen.

Der Gegensatz zwischen „klassischer“ und „intuitionistischer“ Betrachtungsweise soll ausgeschaltet bleiben; schon deshalb, aber auch zum Zweck der Vereinfachung werde nur der speziellste Fall betrachtet, nämlich der Beweis der Nichtabzählbarkeit des Kontinuums. Auf die anderen Angriffspunkte im Bridgmanschen Aufsatz soll hier nicht eingegangen werden; zum Teil (so betreffs des Nachweises irrationaler Zahlen, einiger Paradoxien, der Anwendungsgebiete der Mengenlehre etc.) beruhen sie auf Mißverständnissen.

1. Statt der negativen Behauptung „das Kontinuum ist eine nichtabzählbare Menge“ wähle ich die positive Fassung:

(D) Zu jeder gegebenen (effektiv) abzählbaren Menge von reellen Zahlen gibt es weitere reelle Zahlen, die in der Menge nicht vorkommen.

Das Analogon im Fall der Potenzmenge lautet: Ist m eine Menge und M eine zu m (effektiv) äquivalente Menge von Teilmengen von m , so gibt es Teilmengen von m , die in M nicht vorkommen.

Bei dieser Formulierung bleibt die unter den Intuitionisten selbst strittige Frage, ob das Kontinuum „eine Menge ist“ und was eine solche Aussage bedeutet, ganz außer Acht. Andererseits ist für den, der das Kontinuum als Menge anerkennt, die Formulierung (D) gleichbedeutend mit „das Kontinuum (Menge aller reellen Zahlen) ist nichtabzählbar“, wie sich sofort ergibt vermöge einer elementaren logischen Regel ($\mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{B} \rightarrow \cdot \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{M}$).

Erinnern wir uns nun des üblichen Beweis von (D), der keines

¹⁾ A physicist's second reaction to Mengenlehre, Scripta Mathematica 2 (1934), 101–117 und 234–234. Es sei noch ein auch von Bridgman genanntes, aber wenig in mathematische Kreise gedrungenes Werk angeführt, das einen heftigen Angriff gegen das Diagonalverfahren enthält: A. F. Bentley, Linguistic analysis of mathematics (Bloomington, Ind., 1932); ein Werk, das zwar viele Mißverständnisse verrät, aber doch auch bemerkenswerte Anregungen enthält. (Die Einwände gegen das Diagonalverfahren in L. Fischers Buch Die Grundlagen der Philosophie und der Mathematik [Leipzig 1933] können, da auf groben Irrtümern beruhend, außer Acht bleiben.) Die Ergänzung, die soeben W. M. Rust, JR. zu Bridgmans Aufsatz gibt (Ser. M. 2, 334–336), macht die nachstehenden Hinweise keineswegs überflüssig.

indirekten Verfahrens bedarf! Auf Grund der Tatsache, daß man leicht eine effektive Abbildung zwischen den Punkten einer beiderseits unbegrenzten Geraden und denen eines endlichen Intervalls angeben kann, genügt es sich auf die Punkte bzw. Abszissen eines Intervalls, z. B. (0, 1), zu beschränken. (Dieser Schritt ist unwesentlich und entbehrlich.) Weiter stellt man die reellen Zahlen der gegebenen Menge als n -adische systematische Brüche (z. B. Dezimalbrüche) dar, wobei die natürliche Zahl $n > 1$ und sogar, wenn man gewissen kleinen Unbequemlichkeiten beim Beweis entgehen will, > 2 zu nehmen ist. Überdies wählt man, um eine eindeutige Zuordnung zwischen reellen Zahlen und systematischen Brüchen zu erhalten, für die auf zwei Arten durch systematische Brüche darstellbaren Zahlen eine bestimmte Darstellung, z. B. immer die nicht-abbrechende (die dann die Periode $n-1$ besitzt die). Gegen diesen Schritt, nämlich gegen das Operieren mit den nicht-abbrechenden systematischen Brüchen, wird eingewandt: „Non-terminating“ is obviously only a polite way of saying „infinite“, and such are not things like apples, for no one can present me with one which I may fit into its place... the operations involved in producing the non-terminating decimal cannot be completed, so that it is not legitimate to postulate the performance of other operations, that is arrangement in sequence, after the impossible completion of the non-terminating decimal“. Hier liegt ein Mißverständnis vor, das herrührt vom Gebrauch einer allgemein üblichen verkürzten Ausdrucksweise. Natürlich ist es oft — bei irrationalen Zahlen in der Regel — unmöglich die Ziffernfolge der Darstellung einer gegebenen reellen Zahl zu überblicken, und insofern kann allerdings die Operation der Entwicklung nicht „vollendet“ werden. Aber das ist auch für den Beweis gar nicht nötig; es kommt nur darauf an, für jede fragliche reelle Zahl das Gesetz zu haben, das ihre Entwicklung so weit als gewünscht fortzusetzen gestattet, und dies ist, da die Zahlen der abzählbaren Ausgangsmenge gegeben (somit z. B. ihrer Größe nach mit rationalen Zahlen vergleichbar) sein sollen, jedenfalls erfüllt — wie es z. B. erfüllt ist für die Zahl π , obgleich wir auch bei ihr die Ziffernfolge etwa ihrer Dezimalbruchentwicklung nicht zu übersehen vermögen. Die Betrachtung „aller möglichen Regeln“, die zur Konstruktion nicht-abbrechender systematischer Brüche dienen können, ist somit überflüssig, und damit entfallen die gegen die Gesamtheit dieser Regeln mit Recht erhobenen Be-

denken; man kann *eindeutig* eine Regel zur Entwicklung jeder gegebenen reellen Zahl in einen nicht-abbrechenden n -albruch angeben.

Weiter sind unsere systematischen Brüche bzw. die sie festlegenden Gesetze in eine Folge angeordnet zu denken, was infolge der vorausgesetzten Abzählbarkeit der gegebenen Menge zulässig ist. Es folgt der letzte Schritt, die Bildung des diagonalen n -albruchs: nämlich die Angabe einer *bestimmten* Regel (oder mehrerer solcher Regeln), nach der jede beliebige, etwa r^{te} Ziffer des Diagonalbruchs verschieden ist von 0 und von der r^{ten} Ziffer des r^{ten} n -albruchs unserer Folge. Die Regel kann z. B. folgendermaßen lauten: für die Werte von r , für die die r^{te} Ziffer des r^{ten} n -albruchs 1 ist, sei die r^{te} Ziffer des Diagonalbruchs 2; für alle anderen r sei die r^{te} Ziffer des Diagonalbruchs 1.

Der Haupteinwand, der hiergegen erhoben wird, ist etwa folgender: Da ein nicht-abbrechender n -albruch bzw. eine unendliche Reihe nur ein abgekürzter Ausdruck ist für die Möglichkeit, bis zu beliebig, aber endlich vielen Stellen fortzuschreiten, und nicht etwa ein fertiges Ganzes darstellt, so könne der Beweis nur die Möglichkeit ausdrücken, bei beliebigem r einen bis zur r^{ten} Stelle reichenden n -albruch anzugeben, der in allen Stellen verschieden ist von r gegebenen, ebenso weit reichenden Brüchen. Damit ist aber nichts gewonnen. Denn: „The theorem would demand that it is impossible to set up any scheme for arranging all possible decimal fractions of r digits in a definite order, r being subject to no restriction as to magnitude. But such a theorem is obviously false, for there are not more than 10^r possible decimals of r digits, so that... I can set up a scheme by which any possible decimal of r digits will be found to correspond to some number less than 10^r The ordinary diagonal Verfahren I believe to involve a patent confusion of the program and object aspects of the decimal fraction... In fact, I find it difficult to understand how such a situation should have been capable of persisting in mathematics. Doubtless the confusion is bound up with notions of existence; the decimal fractions are supposed to »exist« whether they can be actually produced and exhibited or not“.

Es ist nun leicht verständlich zu machen, daß all dies auf Mißverständnissen basiert, die wohl durch die übliche kurze Ausdrucksweise des Mathematikers veranlaßt sind. Wir haben oben die n -albrüche als Rechenvorschriften aufgefaßt, die zu jeder reellen

Zahl der gegebenen Folge ihre n -ale Entwicklung so weit als gewünscht zu bilden gestatten. Auf den nämlichen Standpunkt müssen wir uns in bezug auf den zu konstruierenden Diagonalbruch stellen. Dieser ist bestimmt, und zwar als *nicht*-abbrechender (nicht bloß beliebig spät abbrechender) n -albruch, sobald ein Gesetz feststeht, das seine Ziffern bis zu einer beliebigen zu berechnen gestattet. In der oben angeführten Regel (Ende des vorletzten Absatzes) liegt aber ein solches Gesetz: Für jeden Index r bis zur gewünschter Grenze können wir zunächst den r^{ten} n -albruch unserer Folge bis zu r Stellen und damit die r^{te} Stelle des Diagonalbruchs berechnen. Dieser ist also als etwas gewissermaßen Fertiges konstruiert, nämlich sein *Bildungsgesetz* gewonnen. Wir können ihn nach Belieben und ohne jede Willkür hinschreiben, so weit wir wollen, genau wie die Entwicklung von π . Damit dürfte für jeden Standpunkt hinsichtlich der mathematischen Grundlagenfragen, auch für einen entschiedenen Finitismus, die Behauptung (D) einwandfrei bewiesen sein. Unterschiede der Auffassung können nur bestehen hinsichtlich des Begriffs „gegebene (effektiv) abzählbare Menge reeller Zahlen“. Auf diese Unterschiede, die den Begriff der reellen Zahl wie den der Abzählbarkeit betreffen, ist hier kein Anlaß einzugehen; doch werden sie durch den einfachen Spezialfall der Nr. 2 von selbst beleuchtet.

2. Die Rolle des Diagonalverfahrens für den Nachweis der *Existenz transzendenter Zahlen* ist eine besondere Quelle verschiedener Mißverständnisse. Einige Autoren bestreiten diese Bedeutung des Diagonalverfahrens, weil man mit seiner Hilfe für eine (z. B. durch einen Dezimal- oder Kettenbruch, oder auch durch ein bestimmtes Integral etc.) „gegebene“ reelle Zahl nicht entscheiden könne, ob sie algebraisch oder transzendent ist. Diese Autoren rennen offene Türen ein; denn das Diagonalverfahren hat sich niemals eine derartige Leistung angemaßt. Anders steht es mit den Einwänden: Der Nachweis transzendenter Zahlen durch das Diagonalverfahren sei rein abstrakt-existentialer Natur, die in dem fraglichen Beweis auftretende Gesamtheit der algebraischen Zahlen überdies eine unvollendbare, nicht abgeschlossen denkbare Gesamtheit, und endlich verfehle der Beweis sein Ziel, da „the mere act of assigning operational meaning to the transcendentals of itself ensures that they are

denumerable" ¹⁾. Die beiden ersten Argumente genügten namentlich, um den Nachweis transzendenter Zahlen vom intuitionistischen Standpunkt aus wertlos zu machen, der nur Konstruktionen und keine reinen Existenzbeweise anerkennt.

Demgegenüber ist hervorzuheben: *der Nachweis transzendenter Zahlen durch das Diagonalverfahren erfolgt auf streng konstruktivem Weg, und er ist sinnvoll und beweiskräftig für jeden (auch intuitionistischen) Standpunkt, der überhaupt einer der üblichen Zuordnungsregeln zwischen den algebraischen und den natürlichen Zahlen einen Sinn zuerkennt.*

In der Tat: Bleiben wir bei der oben auseinandergesetzten Auffassung, wonach eine reelle Zahl gegeben — und zwar offenbar konstruktiv gegeben — ist, sobald eine Regel vorliegt, die ihre Dezimalbruchentwicklung so weit als gewünscht zu bilden gestattet! (Der geläufigeren Vorstellung und Ausdrucksweise wegen ist hier $n=10$ genommen. Ebenso beschränken wir uns der Bequemlichkeit halber auf *reelle* algebraische und transzendente Zahlen.) Es liege nun eine — z. B. die Cantorsche — Zuordnungsregel zwischen den algebraischen und den natürlichen Zahlen vor; für jede algebraische Zahl, die durch die zugehörige irreduzible algebraische Gleichung und z. B. eine zusätzliche Größenkennzeichnung (unter den endlich vielen Wurzeln der Gleichung) gegeben sei, kann ihre Platznummer vermöge der Zuordnungsregel in endlich vielen Schritten ermittelt, andererseits ihre Dezimalbruchentwicklung bis zu jeder gewünschter Stelle berechnet werden. So ist die r^{te} Dezimalstelle der r^{ten} algebraischen Zahl unserer Abzählung eine wohlbestimmte, berechenbare Ziffer c_r zwischen 0 und 9, die Grenzen eingeschlossen. Wenn wir also, wie in Nr. 1, einen eindeutig bestimmten, Stelle für Stelle berechenbaren Dezimalbruch durch eine Regel angeben, die die r^{te} Ziffer d_r als von c_r verschieden festsetzt, so erhalten wir eine reelle Zahl, die konstruktiv festgelegt und von *jeder* algebraischen Zahl verschieden ist. Wir haben damit eine ganz bestimmte transzendente Zahl konstruiert, wenn auch freilich die Ziffernfolge ihrer Dezimalbruchentwicklung nicht anschaulich übersehbar ist. Die in (D) (Beginn von Nr. 1) besprochene abzählbare Menge ist hier die Menge der algebraischen Zahlen.

¹⁾ Bridgman, loc. cit. p. 233. Gemeint ist offenbar, daß die Menge der algebraischen und der transzendenten Zahlen abzählbar sei, oder jedenfalls Anderes nicht nachgewiesen werden könne.

Contribution à la topologie des polytopes.

Par

Karol Borsuk (Warszawa).

La formule bien connue due aux MM. S. Lefschetz et H. Hopf, concernant le nombre des points invariants des transformations continues ¹⁾ implique que chaque polytope P dont les nombres de Betti ²⁾ remplissent l'égalité

$$(1) \quad \sum_{k=0}^{\infty} p_k(P) = 1$$

contient un point invariant par rapport à toute transformation continue en son sous-ensemble.

Les théorèmes sur la décomposition des polytopes que je vais démontrer dans cette Note nous permettront de prouver que dans le cas des polytopes situés dans l'espace euclidien tridimensionnel E_3 , l'égalité (1) est non seulement suffisante, mais aussi nécessaire pour l'existence d'un point invariant par rapport à toute transformation continue en sous-ensemble.

Théorème 1. *Chaque polytope ³⁾ connexe P de dimension $\leq n$ se laisse décomposer en deux polytopes P_1 et P_2 dont le premier*

¹⁾ Voir S. Lefschetz, Trans. Amer. Math. Soc. 28 (1926), p. 1—49 et H. Hopf, Math. Zeitschr. 29 (1929), p. 493—524. Comp. aussi S. Lefschetz, Topology, New York 1930, p. 359.

²⁾ Quant à la définition des nombres de Betti voir p. ex. le livre cité de M. Lefschetz, p. 34—35 (pour les polytopes) et p. 324—334 (pour les espaces compacts arbitraires). Le nombre de Betti de dimension k d'un espace compact E sera désigné ici par $p_k(E)$.

³⁾ La thèse du théorème 1 serait en défaut pour les espaces un peu plus généraux que les polytopes, p. ex. pour les continus localement contractiles. Il existe,