it follows that $(|\hat{B}_k|)_k$ is uniformly bounded away from zero in U . Hence $\hat{B}$ is bounded away from zero in U and can be continued analytically across x .

If B_1 is any other Blaschke product for R with respect to $(a_n)_n$, then B/B_1 and B_1/B are both in $H^\infty(dm)$. Then B/B_1 is an inner function that is bounded away from zero on R and hence it can be continued analytically across all of X . Thus B/B_1 is an invertible element in $A(X)$ and must be a trivial inner function.

Having shown the existence and uniqueness of Blaschke products for finite Riemann surfaces, we would only remark that "singular functions" and "outer functions" can also be defined in this case and the factorization of bounded analytic functions into Blaschke products, singular functions and outer functions accomplished in the usual manner.

References

- [1] P. R. Ahern and D. Sarason, *The H^p -spaces of a class of function algebras*, Acta Math. 117 (1967), p. 123-163.
- [2] R. Coifman and G. Weiss, *A kernel associated with certain multiply-connected domains and its application to factorization theorems*, Studia Math. 28 (1966), p. 31-68.
- [3] J. Wermer, *Analytic disks in maximal ideal spaces*, Amer. J. Math. 86 (1964), p. 161-170.

Reçu par la Rédaction le 31. 1. 1969

Über die Limitierbarkeit unbeschränkter Doppelfolgen

von

MICHAEL STIEGLITZ (Stuttgart)

1. Einleitung. S. Mazur und W. Orlicz haben im Jahr 1933 ([5], S. 33) folgenden interessanten Satz für Einfachfolgen mitgeteilt:

Limitiert eine permanente (zweidimensionale) Matrix eine beschränkte divergente Folge, so auch eine unbeschränkte. (Einen Beweis findet man z.B. bei Darevsky [1], S. 98). Wie Zeller 1951 ([8], S. 482) und Mazur-Orlicz 1954 ([6], S. 151) zeigten, gilt der obige Satz auch für konvergenztreue Matrizen.

Es fragt sich, inwieweit dieses Ergebnis auch in der *Limitierungstheorie der Doppelfolgen* Gültigkeit hat, wenn man der Untersuchung *vierdimensionale regulär-konvergenztreue Matrizen* zugrunde legt (¹). Dabei wird unter einer regulär-konvergenztreuen Matrix eine Matrix verstanden, die jede regulär-konvergente Doppelfolge — das sind (im Pringsheimschen Sinn) konvergente Doppelfolgen mit konvergenten Zeilen und Spalten — wieder in eine regulär-konvergente Doppelfolge transformiert. Für diese Klasse von Matrizen gilt der dem obigen Ergebnis für Einfachfolgen entsprechende Satz:

Transformiert eine regulär-konvergenztreue Matrix eine beschränkte, nicht regulär-konvergente Doppelfolge in eine regulär-konvergente Doppelfolge, so auch eine unbeschränkte.

2. Definitionen und Hilfssätze. Im folgenden werden Doppelfolgen komplexer Zahlen $x_{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 0, 1, \dots$) mit $x = (x_{\mu\nu})$ bezeichnet und zur Abkürzung

$$x_{\mu\cdot} = \lim_{\nu \rightarrow \infty} x_{\mu\nu}, \quad x_{\cdot\nu} = \lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{\mu\nu}, \quad x_{\cdot\cdot} = \lim_{\mu, \nu \rightarrow \infty} x_{\mu\nu} \quad (\mu, \nu = 0, 1, \dots)$$

sowie

$$\|x\| = \sup_{0 \leq \mu, \nu < \infty} |x_{\mu\nu}|$$

(¹) Von einer wörtlichen Übertragung des obigen Satzes, d. h. von einer Übertragung auf *vierdimensionale konvergenztreue Matrizen* kann abgesehen werden, da eine (im Pringsheimschen Sinn) konvergente Doppelfolge unbeschränkt sein kann. Ohne Beweis sei bemerkt, daß eine konvergenztreue Matrix nicht notwendig regulär-konvergenztreu ist, und umgekehrt.

gesetzt. Weiter ist $A = (a_{mn\mu\nu})_{0 \leq m, n, \mu, \nu < \infty}$ eine vierdimensionale komplexe Matrix und

$$A_{mn}^{\kappa\lambda}(x) = \sum_{\mu, \nu=0}^{\kappa, \lambda} a_{mn\mu\nu} x_{\mu\nu}, \quad A_{mn}(x) = \lim_{\kappa, \lambda \rightarrow \infty} A_{mn}^{\kappa\lambda}(x), \quad A(x) = (A_{mn}(x)) \\ (m, n, \kappa, \lambda = 0, 1, \dots).$$

Mit Hilfe dieser Abkürzungen werden acht lineare Doppelfolgenräume definiert, nämlich

$$S = \{x\}, \quad B = \{x \in S: \|x\| < \infty\}, \quad BC = \{x \in B: x_{..} \text{ existiert}\}, \\ RC = \{x \in BC: x_{\mu}, x_{\nu} (\mu = 0, 1, \dots) \text{ existiert}\}, \quad RCN = \{x \in RC: x_{..} = 0\}, \\ RCA = \{x \in S: A(x) \text{ existiert}, A(x) \in RC\}, \quad D = RCA \cap B, \\ RCA^* = \{x \in RCA: (A_{mn}^{\kappa\lambda}(x))_{0 \leq \kappa, \lambda < \infty} \in BC \text{ } (m, n = 0, 1, \dots \text{ fest})\}.$$

Bezeichnet man die durch die Norm $\|x\|$ definierte Topologie über einer Menge mit T_1 , so sind $(B; T_1)$, $(RC; T_1)$ und $(RCN; T_1)$ Banachräume.

Im Anschluß an Zeller [8], S. 464, werden die Begriffe F - und FDK -Raum wie folgt definiert:

Definition 1 (F -Raum). In dem linearen Raum $X = (X; p_k)$ sei ein Konvergenzbegriff mit Hilfe von abzählbar vielen Halbnormen $p_k(x)$ ($x \in X; k = 0, 1, \dots$) dadurch definiert, daß eine Folge von Elementen $x^i \in X$ Cauchy-Folge heißt, wenn

$$\lim_{i', i'' \rightarrow \infty} p_k(x^{i'} - x^{i''}) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots)$$

ist, und konvergent (gegen x) heißt, wenn es ein $x \in X$ gibt mit

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_k(x^i - x) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots).$$

$(X; p_k)$ wird F -Raum genannt, wenn

- (a) aus $p_k(x) = 0$ ($k = 0, 1, \dots$) $x = 0$ folgt und
- (b) $(X; p_k)$ vollständig ist.

Definition 2 (FDK -Raum). Ist $X \subseteq S$ und stimmt die Bedeutung von $x_1 + x_2$ und tx (t komplex) in X und S überein, so heißt der F -Raum $(X; p_k)$ FDK -Raum, wenn aus $x^i \rightarrow x$ ($X; p_k$)

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_{\mu\nu}^i = x_{\mu\nu} \quad (\mu, \nu = 0, 1, \dots)$$

folgt.

Demnach ist $(S; |x_{\mu\nu}|)$ ein FDK -Raum. Auch

$(RCA^*; T_2)$

$$= (RCA^*; |x_{\mu\nu}| (\mu, \nu = 0, 1, \dots), \sup_{\kappa, \lambda \rightarrow \infty} |A_{mn}^{\kappa\lambda}(x)| (m, n = 0, 1, \dots), \|A(x)\|)$$

ist nach Jürimäe [4], S. 4, ein FDK -Raum. Nach Zeller [8], S. 469, gilt für FDK -Räume der

HILFSSATZ 1. Ist X ein linearer Unterraum des FDK -Raums $(Y; p_k)$ und $y \in Y$ nicht Berührungspunkt von X , dann gibt es ein auf $(Y; p_k)$ lineares stetiges Funktional f mit $f(x) = 0$ ($x \in X$) und $f(y) = 1$.

Nach Wilansky [7], S. 202, wird ein FH -Raum wie folgt definiert:

Definition 3 (FH -Raum). Sei H ein linearer Hausdorffraum und $X \subseteq H$ ein linearer metrischer vollständiger Raum. Dann wird X als FH -Raum bezeichnet, wenn die Topologie von X stärker ist als die von H .

Da $(S; |x_{\mu\nu}|)$ ein linearer Hausdorffraum ist und sich jeder FDK -Raum metrisieren läßt (z.B. durch die Fréchet-Kombination seiner Halbnormen), ist jeder FDK -Raum ein FH -Raum bezüglich $(S; |x_{\mu\nu}|)$. Daraus folgt nach Wilansky [7], S. 203, der

HILFSSATZ 2. Sind X und Y zwei FDK -Räume mit $X \subseteq Y$, so ist die Topologie von X stärker als die von Y .

Die regulär-konvergenztreuen Matrizen lassen sich nach Hamilton ([2] S. 42, Nrn. 5, 7, 8, 9; S. 46, Nrn. 31, 32, 33; S. 57, Nr. 132) folgendermaßen charakterisieren:

HILFSSATZ 3. Eine Matrix A ist genau dann regulär-konvergenztreu, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$(1) \quad \sup_{0 \leq m, n < \infty} \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} |a_{mn\mu\nu}| < \infty;$$

für alle $m, n, \mu, \nu = 0, 1, \dots$ existieren die Grenzwerte

$$\begin{aligned} & \lim_{m \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{m, n \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu}, \\ & \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{\mu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\mu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \\ & \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{\mu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}, \quad \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu}. \end{aligned}$$

Beispiel 1. Jede aus zwei konvergenztreuen Matrizen durch Faktorisierung gebildete Matrix ist regulär-konvergenztreu.

3. Limitierbarkeit unbeschränkter Doppelfolgen. Nach diesen Vorbereitungen läßt sich der folgende Satz beweisen:

SATZ 1. *Es sei A eine regulär-konvergenztreue Matrix. Dann gelten die beiden folgenden Aussagen:*

1. Ist

$$\chi(A) = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{mn\mu\nu} - \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} \lim_{m, n \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu} \neq 0$$

und existiert ein $x \in D \setminus RC$, so existiert auch ein $z \in RCA^* \setminus B$.

2. Ist $\chi(A) = 0$, so existiert ein $z \in RCA^* \setminus B$.

Beweis. Der Beweis orientiert sich an Zeller [8], S. 482, und kann daher kurz gefaßt werden. Die Annahme $RCA^* \subseteq B$ wird in vier Schritten zum Widerspruch geführt.

(a) *Darstellung der linearen $(RCA^*; T_2)$ -stetigen Funktionale auf D .* Wegen (1) ist $D = RCA \cap B = RCA^* \cap B$. Jedes lineare stetige Funktional f auf $(RCA^*; T_2)$ läßt sich nach Jürimäe [4], S. 5, in der Form

(2)

$$f(x) = \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{\mu\nu} x_{\mu\nu} + \sum_{m, n=0}^{\infty} \beta_{mn} A_{mn}(x) + \sum_{m=0}^{\infty} \beta_m A_m(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\beta}_n A_n(x) + \beta A_{..}(x)$$

$$\left(x \in RCA^*, \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} |a_{\mu\nu}| < \infty, \sum_{m, n=0}^{\infty} |\beta_{mn}| < \infty, \sum_{m=0}^{\infty} |\beta_m| < \infty, \sum_{n=0}^{\infty} |\tilde{\beta}_n| < \infty \right)$$

darstellen. Wegen $x \in D \subseteq B$, $A(x) \in RC \subseteq B$ und Hilfssatz 3 können die Grenzwert- und Summenbildungen auf der rechten Seite von (2) vertauscht werden und man erhält

$$(3) \quad f(x) = \sum_{\kappa, \lambda=0}^{\infty} \gamma_{\kappa\lambda} (x_{\kappa\lambda} - x_{\kappa-1, \lambda} - x_{\kappa, \lambda-1} + x_{\kappa-1, \lambda-1}) + \beta A_{..}(x)$$

$$\left(x \in D; \gamma_{\kappa\lambda} = \sum_{\mu=\kappa, \nu=\lambda}^{\infty} \delta_{\mu\nu}; \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} |\delta_{\mu\nu}| < \infty; \right.$$

$$\left. \delta_{\mu\nu} = a_{\mu\nu} + \sum_{m, n=0}^{\infty} \beta_{mn} a_{mn\mu\nu} + \sum_{m=0}^{\infty} \beta_m \lim_{n \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu} + \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\beta}_n \lim_{m \rightarrow \infty} a_{mn\mu\nu} \right).$$

Daher ist für die Doppelfolge

$$RC \ni e^r = \begin{cases} 1 & (\mu \geq r \text{ oder } \nu \geq r) \\ 0 & (\text{sonst}), \end{cases} \quad (r = 0, 1, \dots),$$

$$f(e^r) = \gamma_{or} + \gamma_{ro} - \gamma_{rr} + \beta \lim_{m, n \rightarrow \infty} \left(\sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} - \sum_{\mu, \nu=0}^{r-1} \right) a_{mn\mu\nu},$$

also

$$(4) \quad \lim_{r \rightarrow \infty} f(e^r) = \beta \chi(A).$$

(b) *Ist $\chi(A) \neq 0$, so ist RC T_2 -dicht in D .* Angenommen, es existiert ein $y \in D$, das nicht T_2 -Berührungspunkt von RC ist. Dann gibt es wegen Hilfssatz 1 ein lineares stetiges Funktional f auf $(RCA^*; T_2)$ mit

$$(5) \quad f(x) = 0 \quad (x \in RC)$$

und $f(y) = 1$. Andererseits aus (5) und (4) folgt $\beta = 0$. Daher ist für die Doppelfolge

$$RC \ni e^{kl} = \begin{cases} 1 & (\mu \geq k; \nu \geq l) \\ 0 & (\text{sonst}), \end{cases} \quad (k, l = 0, 1, \dots),$$

$$f(e^{kl}) = \gamma_{kl} = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots),$$

also wegen (3) insbesondere $f(y) = 0$.

(c) *Ist $\chi(A) = 0$, so RCN T_2 -dicht in RC .* Aus der Annahme des Gegenteils folgt wie unter (b) die Existenz eines $y \in RC$ und eines linearen stetigen Funktionals f auf $(RCA^*; T_2)$ mit

$$(6) \quad f(x) = 0 \quad (x \in RCN)$$

und $f(y) = 1$. Andererseits ist die Doppelfolge

$$(e^0 - e^r) \in RCN \quad (r = 1, 2, \dots),$$

also wegen (6) und (4)

$$(7) \quad f(e^0) = 0.$$

Nach Hill-Hamilton ([3], S. 159) gibt es zu jedem $y \in RC$ eine Folge $y^r \in RC$ mit

$$T_1\text{-}\lim_{r \rightarrow \infty} y^r = y,$$

wobei zur Abkürzung

$$(8) \quad y^r = \sum_{\mu=0}^r (y_{\mu} - y_{..})(e^{\mu 0} - e^{\mu+1, 0}) + \sum_{\nu=0}^r (y_{..} - y_{..})(e^{0 \nu} - e^{0, \nu+1}) +$$

$$+ \sum_{\mu, \nu=0}^r (y_{\mu\nu} - y_{\mu} - y_{..} + y_{..})(e^{\mu\nu} - e^{\mu+1, \nu} - e^{\mu, \nu+1} + e^{\mu+1, \nu+1}) + y_{..} e^0$$

$$(r = 0, 1, \dots)$$

gesetzt ist. Wegen $RC \subseteq RCA^*$ und Hilfssatz 2 ist

$$T_2\text{-}\lim_{r \rightarrow \infty} y^r = y.$$

Zusammen mit (6) und (7) folgt daraus $f(y) = 0$, da bis auf e^0 alle Doppelfolgen, die auf der rechten Seite von (8) summiert werden, aus RCN sind.

(d) *Nachweis des Widerspruchs.* Aus der Annahme $RC A^* \subseteq B$ und Hilfssatz 2 folgt im Fall $\chi(A) \neq 0$, daß RC in D T_1 -dicht ist, und im Fall $\chi(A) = 0$, daß RCN in RC T_1 -dicht ist. Das widerspricht der Tatsache, daß $(RC; T_1)$ und $(RCN; T_1)$ Banachräume sind und ein $x \in D \setminus RC$ existiert.

Wenn man davon absieht, daß im Fall $\chi(A) = 0$ die Existenz eines $x \in D \setminus RC$ gar nicht gefordert wird, dann läßt sich wegen $RC A^* \subseteq RC A$ das Ergebnis von Satz 1 durch den folgenden Satz 2 noch einfacher, wenn auch weniger allgemein formulieren:

SATZ 2. *Transformiert eine regulär-konvergenztreue vierdimensionale Matrix eine beschränkte, nicht regulär-konvergente Doppelfolge in eine regulär-konvergente Doppelfolge, so auch eine unbeschränkte.*

Literaturnachweis

- [1] V. Darevsky, *On intrinsically perfect methods of summation*, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. mat. (Bull. Acad. Sc. URSS) 10 (1946), S. 97–104 (Russisch; englischer Auszug).
- [2] H. J. Hamilton, *Transformations of multiple sequences*, Duke Math. J. 2 (1936), S. 29–60.
- [3] — and J. D. Hill, *Operation theory and multiple sequence transformations*, ibidem 8 (1941), S. 154–162.
- [4] E. Jürimäe, *Funktsionaalanalüüsi Meetodid Kahekordsete Riidade Teoorias*, Tartu Riikl. Ül. Toimetised 55 (1958), S. 3–7 (Estnisch).
- [5] S. Mazur et W. Orlicz, *Sur les méthodes linéaires de sommation*, C. R. Acad. Sc. Paris 196 (1933), S. 32–34.
- [6] — *On linear methods of summability*, Studia Math. 14 (1954), S. 129–160.
- [7] A. Wilansky, *Functional analysis*, New York — Toronto — London 1964.
- [8] K. Zeller, *Allgemeine Eigenschaften von Limitierungsverfahren*, Math. Z. 53 (1951), S. 463–487.

Reçu par la Rédaction le 8. 2. 1969

Spektraleigenschaften eindimensionaler Differentialoperatoren höherer Ordnung

von

E. MÜLLER-PFEIFFER (Jena, DDR)

Der zugrunde liegende Hilbertraum ist $L_2(-\infty, +\infty)$, die Menge der im Lebesgueschen Sinne quadratisch integrierbaren (komplexwertigen) Funktionen, die auf der x -Achse definiert sind. Es wird das kontinuierliche Spektrum ⁽¹⁾ von selbstadjungierten Differentialoperatoren untersucht, die von dem Differentialausdruck

$$(1) \quad l[y] = (-1)^n [p_0 y^{(n)}]^{(n)} + (-1)^{n-1} [p_1 y^{(n-1)}]^{(n-1)} + \dots + p_n y, \quad n \geq 1,$$

erzeugt werden. Von den Koeffizienten $p_k = p_k(x)$ wird vorausgesetzt, daß es reelle Funktionen sind und daß sie resp. lokal zu den Sobolewschen Räumen $W_2^{n-k}(-\infty, +\infty)$ gehören [10],

$$(2) \quad p_k(x) \in W_{2, \text{loc}}^{n-k}(-\infty, +\infty).$$

Dann ist $l[y] \in L_2(-\infty, +\infty)$, wenn $y(x)$ zu $C_0^\infty(-\infty, +\infty)$ gehört, d.h. wenn $y(x)$ beliebig oft differenzierbar ist und einen kompakten Träger besitzt. Durch

$$Ay = l[y], \quad D(A) = C_0^\infty(-\infty, +\infty),$$

wird ein Operator definiert, dessen Definitionsbereich $D(A)$ im Hilbertraum $L_2(-\infty, +\infty)$ dicht liegt; A ist symmetrisch. Alle selbstadjungierten Erweiterungen von A besitzen bekanntlich das gleiche kontinuierliche Spektrum ([8], S. 203).

Die vorliegenden Untersuchungen befassen sich mit der Frage, welchen Einfluß das Verhalten der Koeffizienten $p_k(x)$ auf die Lokalisierung des kontinuierlichen Spektrums einer selbstadjungierten Erweiterung $\bar{A}$ von A hat. Dazu werden folgende zusätzlichen Voraussetzungen über die Koeffizienten gemacht:

$$1. \quad p_0(x) \geq c_0 > 0.$$

⁽¹⁾ Als *kontinuierliches Spektrum* wird die Menge der Häufungspunkte des Spektrums verstanden.