# LII OLIMPIADA MATEMATYCZNA

Do Pani/Pana Dyrektora Szkoły
Do Pani/Pana Profesora Matematyki

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej uprzejmie prosi o zapoznanie uczniów i nauczycieli zainteresowanych zadaniami Olimpiady z podanymi tu rozwiązaniami zadań konkursowych stopnia pierwszego LII Olimpiady Matematycznej.

W dalszej części niniejszego druku podajemy teksty zadań z zawodów międzynarodowych: XLI Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej i XXIII Austriacko–Polskich Zawodów Matematycznych, a także z XI Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich (*Baltic Way* 2000).

Zawody pierwszego stopnia LII Olimpiady Matematycznej są zakończone. Zawody stopnia drugiego odbędą się w dniach 23 i 24 lutego 2001 r. Zawody stopnia trzeciego odbędą się w dniach 2 i 3 kwietnia 2001 r.

Zawiadomienia o dokładnym terminie i miejscu zawodów stopnia drugiego wyślą komitety okręgowe zakwalifikowanym zawodnikom w terminie do dnia 10 lutego 2001 r.

Zadania z poprzednich Olimpiad Matematycznych oraz bieżące informacje można znaleźć w internecie pod adresem:

`www.impan.gov.pl/~olimp/`

*Komitet Główny Olimpiady Matematycznej*

## Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego LII Olimpiady Matematycznej [1]

*Zadanie* **1.** Rozwiązać w liczbach całkowitych równanie

$$x^{2000}+2000^{1999}=x^{1999}+2000^{2000}.$$

*Rozwiązanie*

Dane równanie sprowadzamy do postaci $f(x)=f(2000)$, gdzie

$$f(x)=x^{2000}-x^{1999}=(x-1)x^{1999}.$$

Ponieważ $f$ jest funkcją rosnącą na przedziale $\langle 1,\infty)$, więc dane równanie ma w tym przedziale tylko jedno rozwiązanie, którym jest $x=2000$. Na zbiorze $(-\infty,0\rangle$ funkcja $f$ jest malejąca, więc istnieje co najwyżej jedna liczba całkowita ujemna $a$, dla której $f(a)=f(2000)$. Jednakże

$$f(-1999)=2000\cdot 1999^{1999}<1999\cdot 2000^{1999}=f(2000)=f(a)$$

oraz

$$f(-2000)=2001\cdot 2000^{1999}>1999\cdot 2000^{1999}=f(2000)=f(a).$$

Zatem $a\in(-2000,-1999)$, co przeczy temu, że $a$ jest liczbą całkowitą.

*Odpowiedź:*

Dane równanie ma jedno rozwiązanie w liczbach całkowitych: $\boldsymbol{x=2000}$.

*Zadanie* **2.** Punkty $D$ i $E$ leżą odpowiednio na bokach $BC$ i $AC$ trójkąta $ABC$. Odcinki $AD$ i $BE$ przecinają się w punkcie $P$. Punkty $K$ i $L$ leżą odpowiednio na bokach $BC$ i $AC$, przy czym czworokąt $CLPK$ jest równoległobokiem. Dowieść, że

$$\frac{AE}{EL}=\frac{BD}{DK}.$$

*Rozwiązanie*

Ponieważ $KD\parallel LP$, $DP\parallel PA$ oraz $PK\parallel AL$, więc trójkąty $KDP$ i $LPA$ są podobne (rys. 1). Zatem

$$\frac{DK}{PL}=\frac{PK}{AL},\qquad \text{czyli}\qquad AL\cdot DK=PK\cdot PL.$$



rys. 1

Analogicznie, korzystając z podobieństwa trójkątów $LEP$ i $KPB$ dowodzimy, że $BK\cdot EL=PL\cdot PK$. Na mocy dwóch ostatnich równości otrzymujemy

$$AL\cdot DK=BK\cdot EL,\qquad \text{czyli}\qquad \frac{AL}{EL}=\frac{BK}{DK}.$$

Stąd

$$\frac{AE+EL}{EL}=\frac{BD+DK}{DK},\qquad \text{a więc}\qquad \frac{AE}{EL}=\frac{BD}{DK}.$$

[1] Opracowali *Waldemar Pompe* i *Jarosław Wróblewski*.

*Zadanie* **3.** Znaleźć wszystkie takie liczby naturalne $n \geqslant 2$, że nierówność

$$(1) \qquad x_1x_2+x_2x_3+\ldots+x_{n-1}x_n \leqslant \frac{n-1}{n}\left(x_1^2+x_2^2+\ldots+x_n^2\right)$$

zachodzi dla dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich $x_1,x_2,\ldots,x_n$.

*Rozwiązanie*

*Odpowiedź:* Jedyną liczbą spełniającą warunki zadania jest $\boldsymbol{n=2}$.

Dla $n=2$ dana nierówność przyjmuje postać

$$x_1x_2 \leqslant \tfrac{1}{2}(x_1^2+x_2^2), \quad \text{co sprowadza się do} \quad 0 \leqslant \tfrac{1}{2}(x_1-x_2)^2\,.$$

Zatem liczba $n=2$ spełnia warunki zadania.

Jeśli $n \geqslant 3$, to nierówność (1) nie jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich. Liczby

$$(2) \qquad x_1=3, \quad x_2=x_3=\ldots=x_{n-1}=4, \quad x_n=3$$

stanowią kontrprzykład. Istotnie: wstawiając powyższe wartości do nierówności (1) uzyskujemy

$$12+\underbrace{16+16+\ldots+16}_{n-3}+12 \leqslant \frac{n-1}{n}(9+\underbrace{16+16+\ldots+16}_{n-2}+9).$$

Przekształcając równoważnie powyższą nierówność otrzymujemy $3n \leqslant 7$, co nie jest prawdą, gdy $n \geqslant 3$.

*Zadanie* **4.** Rozstrzygnąć, czy w sześciennym pudełku o krawędzi 4 można umieścić 65 kul o średnicy 1.

*Rozwiązanie*

*Odpowiedź:* Można.

Sposób umieszczenia kul jest następujący.

Na dnie pudełka umieszczamy warstwę złożoną z 16 kul. Następnie kładziemy warstwę złożoną z 9 kul, z których każda jest styczna do czterech kul pierwszej warstwy (rys. 1 i 2). Trzecia warstwa składa się z 16 kul stycznych do kul drugiej warstwy (rys. 4 i 5). Podobnie umieszczamy dwie następne warstwy (rys. 6).



rys. 1 (widok z góry)



rys. 2 (widok z boku)




rys. 3

Łącznie umieściliśmy więc $16+9+16+9+16=66$ kul. Pozostaje obliczyć, jak wysoko sięga piąta warstwa.



rys. 4 (widok z góry)



rys. 5 (widok z boku)



rys. 6 (widok z boku)

Wybierzmy dowolną kulę drugiej warstwy; kula ta jest styczna do czterech kul pierwszej warstwy. Środki tych pięciu kul są wierzchołkami ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego każda krawędź ma długość 1 (rys. 3). Na mocy twierdzenia Pitagorasa wysokość tego ostrosłupa wynosi $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Stąd wynika, że najwyższy punkt, do którego sięga piąta warstwa, jest odległy od płaszczyzny podstawy o $\frac{1}{2}+4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}=1+2\sqrt{2}<4$. Umieszczone w ten sposób 66 kul mieści się w sześciennym pudełku o krawędzi 4.

*Zadanie* **5.** Dowieść, że dla dowolnej liczby naturalnej $n \geqslant 2$ i dowolnej liczby pierwszej $p$ liczba $n^{p^p}+p^p$ jest złożona.

*Rozwiązanie*

Jeżeli $p$ jest liczbą pierwszą nieparzystą, to na mocy tożsamości

$$(1) \qquad x^p+y^p=(x+y)(x^{p-1}-x^{p-2}y+x^{p-3}y^2-\ldots-xy^{p-2}+y^{p-1}),$$

w której kładziemy $x=n^{p^{p-1}}$ i $y=p$, liczba $n^{p^p}+p^p$ jest złożona. (Dla powyższych wartości $x$, $y$ zachodzą nierówności $x^p+y^p>x+y>1$, więc każdy z czynników stojących po prawej stronie wzoru (1) jest większy od 1).

Natomiast dla $p=2$ otrzymujemy $n^4+4=(n^2+2n+2)(n^2-2n+2)$. Ponieważ $n \geqslant 2$, więc oba czynniki są większe od 1. Stąd wynika, że dla $n \geqslant 2$ liczba $n^4+4$ jest złożona.

*Zadanie* **6.** Liczby całkowite $a$, $b$, $x$, $y$ spełniają równanie

$$a+b\sqrt{2001}=\left(x+y\sqrt{2001}\right)^{2000}.$$

Udowodnić, że $a \geqslant 44b$.

*Rozwiązanie*

Wykażemy najpierw, że zachodzi następująca równość:

$$(1) \qquad a-b\sqrt{2001}=\left(x-y\sqrt{2001}\right)^{2000}.$$

Istotnie: ze wzoru dwumianowego Newtona otrzymujemy

$$\left(x+y\sqrt{2001}\right)^{2000}=\sum_{k=0}^{2000}\binom{2000}{k}y^k 2001^{k/2}x^{2000-k}=c+d\sqrt{2001},$$

gdzie liczby całkowite $c$, $d$ są dane przez:

$$(2)\quad c=\sum_{\ell=0}^{1000}\binom{2000}{2\ell}y^{2\ell}2001^{\ell}x^{2000-2\ell},\quad d=\sum_{\ell=0}^{999}\binom{2000}{2\ell+1}y^{2\ell+1}2001^{\ell}x^{1999-2\ell}.$$

Korzystając z danej w treści zadania równości uzyskujemy

$$(a-c)+(b-d)\sqrt{2001}=0.$$

Z niewymierności liczby $\sqrt{2001}$ wynika, że $b=d$, co z kolei pociąga za sobą $a=c$. Zatem na mocy związków (2) otrzymujemy

$$a-b\sqrt{2001}=c-d\sqrt{2001}=$$

$$=\sum_{k=0}^{2000}\binom{2000}{k}(-y)^k 2001^{k/2}x^{2000-k}=\left(x-y\sqrt{2001}\right)^{2000},$$

co dowodzi równości (1).

Z zależności (1) wynika, że $a\geqslant b\sqrt{2001}$. Ponadto

$$2a=\left(x+y\sqrt{2001}\right)^{2000}+\left(x-y\sqrt{2001}\right)^{2000}\geqslant 0.$$

Jeżeli $b<0$, to nierówność podana w tezie zadania jest spełniona, gdyż $a\geqslant 0$. Jeśli zaś $b\geqslant 0$, to

$$a\geqslant b\sqrt{2001}\geqslant 44b.$$

*Zadanie* **7.** Dany jest trójkąt równoramienny $ABC$ o kącie prostym przy wierzchołku $A$. Punkty $D$ i $E$ leżą na przeciwprostokątnej $BC$, przy czym $\sphericalangle DAE=45^\circ$. Okrąg opisany na trójkącie $ADE$ przecina boki $AB$ i $AC$ odpowiednio w punktach $P$ i $Q$. Dowieść, że $BP+CQ=PQ$.

*Rozwiązanie*

Punkty $A$, $P$, $E$, $D$ leżą na jednym okręgu, więc $\sphericalangle ADE=\sphericalangle BPE$ (rys. 1). Ponadto $\sphericalangle DAE=45^\circ=\sphericalangle PBE$. Z powyższych równości wynika, że trójkąty $ADE$ i $BPE$ są podobne, skąd w szczególności

$$(1)\qquad \sphericalangle AED=\sphericalangle BEP.$$

Analogicznie dowodzimy, że

$$(2)\qquad \sphericalangle ADE=\sphericalangle CDQ.$$



rys. 1

Niech $A'$, $P'$, $Q'$ będą odpowiednio punktami symetrycznymi do $A$, $P$, $Q$ względem prostej $BC$. Na mocy równości (1) punkty $A$, $E$, $P'$ są współliniowe; z równości (2) wynika, że punkty $A$, $D$, $Q'$ są współliniowe.

Pozostaje wykazać, że $BP'+CQ'=P'Q'$, przy założeniu, że punkty $P'$ i $Q'$ leżą odpowiednio na bokach $BA'$ i $CA'$ kwadratu $ABA'C$ oraz spełniony jest warunek $\sphericalangle P'AQ'=45^\circ$ (rys. 2).

Niech $K$ będzie punktem symetrycznym do punktu $B$ względem prostej $AP'$. Wówczas



rys. 2

(3) $\quad AC = AK \qquad$ oraz $\qquad \sphericalangle AKP' = 90°.$

Ponadto

$$\sphericalangle CAQ' = 45° - \sphericalangle P'AB = \\ = 45° - \sphericalangle P'AK = \sphericalangle KAQ'.$$

Z ostatniej zależności oraz z pierwszej równości (3) wynika, że trójkąty $CAQ'$ i $KAQ'$ są przystające (cecha *bok-kąt-bok*).

Zatem $\sphericalangle AKQ' = 90°$, co w połączeniu z drugą równością (3) dowodzi, że punkty $P'$, $K$, $Q'$ leżą na jednej prostej. Stąd $BP' + CQ' = KP' + KQ' = = P'Q'$, co należało wykazać.

*Zadanie* **8.** Rozstrzygnąć, dla jakich par liczb naturalnych $m$ i $n$ prostokąt o bokach długości $m$ i $n$ można pociąć na części przystające do figury na rysunku. Każdy z czterech kwadratów na rysunku ma bok długości 1.



*Rozwiązanie*

*Odpowiedź:* Żądany podział jest możliwy wtedy i tylko wtedy, gdy $m,n > 1$ oraz iloczyn $mn$ jest podzielny przez 8.

Załóżmy najpierw, że udało nam się pociąć prostokąt $m \times n$ na części przystające do danej figury (które w dalszej części rozwiązania będziemy nazywać *klockami*). Oczywiście $m,n > 1$. Wykażemy, że $8|mn$.

Każdy klocek składa się z czterech kwadratów jednostkowych, zatem iloczyn $mn$ (pole prostokąta) musi być liczbą podzielną przez 4. Stąd w szczególności wynika, że długość jednego z boków prostokąta $m \times n$ jest liczbą parzystą. Przyjmijmy więc, bez straty ogólności, że szerokość prostokąta, np. wielkość $m$, jest parzysta.

Podzielmy dany prostokąt na $mn$ kwadratów jednostkowych (które będziemy dalej nazywać *kratkami*). Wówczas prostokąt składa się z $m$ (a więc parzystej liczby) kolumn, z których każda zawiera $n$ kratek (rys. 1).



rys. 1



rys. 2

Pomalujmy kolumny prostokąta na przemian na czarno i biało (rys. 2). Każdy klocek wycięty z tak pomalowanego prostokąta zawiera trzy kratki jednego koloru i jedną kratkę drugiego koloru. Ponieważ liczba kratek białych danego prostokąta jest równa liczbie kratek czarnych, więc klocków zawierających trzy kratki białe musi być tyle samo, co klocków zawierających trzy kratki czarne. Liczba klocków, na które składa się cały prostokąt, jest więc parzysta, co oznacza, że iloczyn $mn$ jest podzielny przez 8.

Załóżmy teraz, że $m,n>1$ oraz $8|mn$. Wykażemy, że prostokąt $m\times n$ da się pociąć na klocki.

Zauważmy, że prostokąty $4\times 2$ oraz $8\times 3$ da się pociąć na klocki (rys. 3, 4). Zatem wystarczy wykazać, że prostokąt $m\times n$ da się pociąć na prostokąty $4\times 2$ oraz $8\times 3$.



rys. 3



rys. 4

Jeśli jedna z liczb $m$, $n$ jest podzielna przez 4, a druga parzysta, to prostokąt $m\times n$ da się pociąć na prostokąty $4\times 2$ (rys. 5), bez konieczności używania prostokątów $8\times 3$.



rys. 5



rys. 6

Pozostał do rozpatrzenia przypadek, w którym jedna z liczb $m$, $n$ jest podzielna przez 8 (bez straty ogólności przyjmijmy, że jest nią $m$), zaś druga (czyli $n$) jest nieparzysta i nie mniejsza niż 3. Prostokąt $m\times n$ dzielimy wówczas na dwa prostokąty $m\times(n-3)$ i $m\times 3$, z których pierwszy dzielimy na prostokąty $4\times 2$, a drugi na prostokąty $8\times 3$ (rys. 6). Zatem również i w tym przypadku żądany podział jest możliwy.

*Zadanie* **9.** Dowieść, że wśród dowolnych 12 kolejnych liczb całkowitych dodatnich istnieje liczba nie będąca sumą 10 czwartych potęg liczb całkowitych.

*Rozwiązanie*

Liczba będąca czwartą potęgą liczby całkowitej daje z dzielenia przez 16 resztę 0 lub 1. Istotnie: dla liczb parzystych postaci $2k$ mamy $(2k)^4=16k^4$, natomiast dla liczb nieparzystych $2k+1$ uzyskujemy

$$(2k+1)^4=16\Big(k^4+2k^3+\tfrac{1}{2}k(3k+1)\Big)+1.$$

(Liczba $\frac{1}{2}k(3k+1)$ jest całkowita dla dowolnej liczby całkowitej $k$).

Stąd wynika, że liczba, która jest sumą 10 czwartych potęg liczb całkowitych, daje z dzielenia przez 16 jedną z *jedenastu* reszt: 0,1,2,3,...,10. Wśród 12 kolejnych liczb całkowitych żadne dwie nie dają tej samej reszty z dzielenia przez 16. Zatem któraś z tych 12 liczb nie daje z dzielenia przez 16 reszty ze zbioru $\{0,1,2,3,\ldots,10\}$. Ta liczba nie może być więc sumą 10 czwartych potęg liczb całkowitych.

*Zadanie* **10.** Dowieść, że wewnątrz dowolnego trójkąta $ABC$ istnieje punkt $P$ o następującej własności:
Każda prosta przechodząca przez punkt $P$ dzieli obwód trójkąta $ABC$ w takim samym stosunku, w jakim dzieli ona jego pole.

*Rozwiązanie*

Wykażemy, że własność opisaną w treści zadania ma środek okręgu wpisanego.

Niech $\ell$ będzie dowolną prostą przechodzącą przez punkt $P$ będący środkiem okręgu wpisanego w trójkąt $ABC$ (rys. 1). Bez straty ogólności przyjmijmy, że prosta $\ell$ przecina boki $AC$ i $BC$ odpowiednio w punktach $D$ i $E$. Należy wykazać, że



rys. 1

(1) $$\frac{[ABED]}{[DEC]}=\frac{DA+AB+BE}{EC+CD},$$

gdzie $[\mathcal{F}]$ jest polem figury $\mathcal{F}$. Oznaczając przez $r$ promień okręgu wpisanego w trójkąt $ABC$ otrzymujemy

(2) $$[ABED]=[DAP]+[ABP]+[BEP]=\tfrac{1}{2}DA\cdot r+\tfrac{1}{2}AB\cdot r+\tfrac{1}{2}BE\cdot r= \\ =\tfrac{1}{2}(DA+AB+BE)\cdot r$$

oraz

(3) $$[DEC]=[ECP]+[CDP]=\tfrac{1}{2}EC\cdot r+\tfrac{1}{2}CD\cdot r=\tfrac{1}{2}(EC+CD)\cdot r.$$

Dzieląc stronami równości (2) i (3) uzyskujemy równość (1).

*Zadanie* **11.** Układ liczb całkowitych dodatnich $c_1,c_2,\ldots,c_n$ nazwiemy dopuszczalnym, gdy za pomocą wagi szalkowej i dwóch kompletów odważników o ciężarach $c_1,c_2,\ldots,c_n$ można zważyć dowolny przedmiot o ciężarze będącym liczbą naturalną nie przekraczającą $2(c_1+c_2+\ldots+c_n)$. Dla każdej liczby $n$ wyznaczyć maksymalną sumę $n$ liczb tworzących układ dopuszczalny.

*Uwaga:* Odważniki można kłaść na obie szalki wagi.

*Rozwiązanie*

Niech $p_1,p_2,\ldots,p_n$ oraz $q_1,q_2,\ldots,q_n$ będą dwoma zestawami odważników o ciężarach odpowiednio $c_1,c_2,\ldots,c_n$. Wykażemy najpierw, że za pomocą tych dwóch zestawów możemy zważyć co najwyżej $\frac{1}{2}(5^n-1)$ przedmiotów, niezależnie od tego, czy liczby $c_1,c_2,\ldots,c_n$ tworzą układ dopuszczalny, czy nie.

Ustawienie odważników na szalkach wagi nazwiemy *optymalnym*, jeśli dla każdego $k\in\{1,2,\ldots,n\}$ ciężarki $p_k$ i $q_k$ nie znajdują się na dwóch różnych szalkach wagi.

Aby otrzymać ustawienie optymalne, dwa odważniki $p_k$ i $q_k$ możemy ustawić na szalkach wagi na 5 sposobów (zob. tabela obok). Zatem liczba wszystkich optymalnych ustawień odważników jest równa $5^n$. W tej liczbie mieści się jedno ustawienie „puste", w którym na żadną szalkę nie kładziemy odważników. Pozostałe ustawienia można połączyć w pary symetryczne, w których jedno ustawienie powstaje z drugiego przez zamianę zawartości obydwu szalek wagi.

| lewa szalka | prawa szalka |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |

Tak więc liczba niepustych, istotnie różnych optymalnych ustawień odważników wynosi $\frac{1}{2}(5^n-1)$, co oznacza, że możemy zważyć co najwyżej $\frac{1}{2}(5^n-1)$ przedmiotów o różnych ciężarach.

Załóżmy, że liczby $c_1,c_2,\ldots,c_n$ tworzą układ dopuszczalny. Wówczas masa najcięższego przedmiotu, jaki można zważyć, wynosi $2(c_1+c_2+\ldots+c_n)$. Ponieważ nie da się zważyć więcej niż $\frac{1}{2}(5^n-1)$ przedmiotów,

(1) $$2(c_1+c_2+\ldots+c_n)\leqslant\tfrac{1}{2}(5^n-1).$$

Wykażemy teraz, że liczby $c_1=1$, $c_2=5$, $c_3=5^2$, ..., $c_n=5^{n-1}$ tworzą układ dopuszczalny. Dla tych wartości $c_i$ zachodzi równość

(2) $$2(c_1+c_2+\ldots+c_n)=\tfrac{1}{2}(5^n-1).$$

Należy więc udowodnić, że za pomocą dwóch kompletów odważników o ciężarach 1, 5, $5^2$, ..., $5^{n-1}$ można zważyć każdy przedmiot o ciężarze będącym liczbą naturalną nie przekraczającą $\frac{1}{2}(5^n-1)$. Dowód tego faktu przeprowadzimy na dwa sposoby.

*Sposób* I

Indukcja. Dla $n=1$ mamy dwa odważniki o ciężarze 1 każdy i za ich pomocą można zważyć przedmiot o ciężarze 1 lub $2=\frac{1}{2}(5^1-1)$.

Załóżmy, że dysponujemy dwoma zestawami odważników o ciężarach 1, 5, $5^2$, ..., $5^{n-1}$ i za ich pomocą umiemy zważyć każdy przedmiot o ciężarze nie przekraczającym $\frac{1}{2}(5^n-1)$. Oto jak zważyć przedmiot $p$ o ciężarze $c$, gdy:

(a) $c \in \langle \frac{1}{2}(5^n-1)+1, 5^n-1 \rangle$.

Korzystając z założenia indukcyjnego ważymy najpierw przedmiot $q$ o ciężarze $5^n-c$ kładąc go na prawą szalkę wagi. Następnie kładziemy dodatkowy ciężarek o masie $5^n$ na *prawą* szalkę wagi, zdejmujemy przedmiot $q$ i kładziemy przedmiot $p$ na *lewą* szalkę.

(b) $c \in \langle 5^n+1, \frac{1}{2}(3\cdot 5^n-1) \rangle$.

Podobnie jak w przypadku (a), ważymy najpierw przedmiot $q$ o ciężarze $c-5^n$ kładąc go na prawą szalkę wagi. Następnie kładziemy dodatkowy ciężarek o masie $5^n$ na *lewą* szalkę wagi, zdejmujemy przedmiot $q$ i kładziemy przedmiot $p$ na *prawą* szalkę.

(c) $c \in \langle \frac{1}{2}(3\cdot 5^n-1)+1, 2\cdot 5^n-1 \rangle$.

Ważymy najpierw przedmiot $q$ o ciężarze $2\cdot 5^n-c$ kładąc go na prawą szalkę wagi. Następnie kładziemy dwa ciężarki o masie $5^n$ na *prawą* szalkę wagi, zdejmujemy przedmiot $q$, po czym kładziemy przedmiot $p$ na *lewą* szalkę.

(d) $c \in \langle 2\cdot 5^n+1, \frac{1}{2}(5^{n+1}-1) \rangle$.

Ważymy najpierw przedmiot $q$ o ciężarze $c-2\cdot 5^n$ kładąc go na prawą szalkę wagi. Następnie kładziemy dwa ciężarki o masie $5^n$ na *lewą* szalkę wagi, zdejmujemy przedmiot $q$, po czym kładziemy przedmiot $p$ na *prawą* szalkę.

Przedmioty o masach $5^n$ i $2\cdot 5^n$ można zważyć używając jedynie dwóch odważników o masie $5^n$. Dowód indukcyjny został więc zakończony.

*Sposób* II

Niech $c$ będzie dowolną liczbą naturalną nie przekraczającą $\frac{1}{2}(5^n-1)$. Wówczas liczba $c+\frac{1}{2}(5^n-1)$ jest mniejsza od $5^n$. Liczbę tę można zatem zapisać w systemie piątkowym przy użyciu co najwyżej $n$ cyfr. Innymi słowy

$$c+\tfrac{1}{2}(5^n-1) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 5^i, \quad \text{gdzie} \quad a_i \in \{0,1,2,3,4\}.$$

Ponieważ $\frac{1}{2}(5^n-1) = 2(1+5+5^2+\ldots+5^{n-1})$, więc

$$c = \sum_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i 5^i, \quad \text{gdzie} \quad \varepsilon_i \in \{-2,-1,0,1,2\}.$$

Powyższa równość oznacza, że przedmiot o ciężarze $c$ można zważyć za pomocą dwóch kompletów odważników o ciężarach 1, 5, $5^2$, ..., $5^{n-1}$, co kończy dowód.

Z równości (1) i (2) wynika, że maksymalna suma zbioru $n$ liczb dopuszczalnych wynosi $\frac{1}{4}(5^n-1)$.

*Zadanie* **12.** Rozpatrujemy ciągi liczb całkowitych $x_0,x_1,\ldots,x_{2000}$ spełniające warunki

$$x_0=0 \quad \text{oraz} \quad |x_n|=|x_{n-1}+1| \qquad \text{dla } n=1,2,\ldots,2000.$$

Znaleźć najmniejszą wartość wyrażenia $|x_1+x_2+\ldots+x_{2000}|$.

*Rozwiązanie*

*Odpowiedź:* Najmniejsza wartość danego wyrażenia wynosi **12**.

Wykażemy indukcyjnie, że dla dowolnego ciągu $(x_n)$ spełniającego warunki zadania zachodzi równość

(1) $$x_0+x_1+x_2+\ldots+x_n=\tfrac{1}{2}(x_n^2+2x_n-n) \qquad (n=0,1,2,3,\ldots,2000).$$

Dla $n=0$ obie strony powyższej równości są równe 0. Załóżmy więc, że zależność (1) jest prawdziwa dla pewnego $n$. Wówczas

$$\begin{aligned}x_0+x_1+x_2+\ldots+x_n+x_{n+1}&=\tfrac{1}{2}(x_n^2+2x_n-n)+x_{n+1}=\\&=\tfrac{1}{2}((x_n+1)^2-(n+1))+x_{n+1}=\tfrac{1}{2}(x_{n+1}^2-(n+1))+x_{n+1}=\\&=\tfrac{1}{2}(x_{n+1}^2+2x_{n+1}-(n+1)),\end{aligned}$$

co kończy dowód indukcyjny wzoru (1).

Zatem

$$|x_1+x_2+\ldots+x_{2000}|=\tfrac{1}{2}|x_{2000}^2+2x_{2000}-2000|=\tfrac{1}{2}|(x_{2000}+1)^2-2001|.$$

Liczbą kwadratową leżącą najbliżej liczby 2001 jest $2025=45^2$. Stąd oraz z powyższej równości wnioskujemy, że wyrażenie $|x_1+x_2+\ldots+x_{2000}|$ nie może przyjąć wartości mniejszej niż $\frac{1}{2}|2025-2001|=12$.

Pozostaje zauważyć, że wartość 12 można zrealizować przyjmując

$$x_n=\begin{cases} n & \text{dla } n\leqslant 44;\\ -45 & \text{dla } n>44,\ n \text{ nieparzyste};\\ 44 & \text{dla } n>44,\ n \text{ parzyste}.\end{cases}$$

Powyższy ciąg spełnia warunki zadania. Ponadto $x_{2000}=44$, co na mocy równości (1) daje $|x_1+x_2+\ldots+x_{2000}|=12$.

## Zadania z XLI Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej

Taejon (Korea Południowa), 19 i 20 lipca 2000 r.

**1.** Dwa okręgi $\Gamma_1$ i $\Gamma_2$ przecinają się w punktach $M$ i $N$. Niech $l$ będzie taką wspólną prostą styczną do $\Gamma_1$ i $\Gamma_2$, że punkt $M$ znajduje się bliżej prostej $l$ niż punkt $N$. Prosta $l$ jest styczna do $\Gamma_1$ w punkcie $A$ oraz do $\Gamma_2$ w punkcie $B$. Prosta równoległa do $l$ przechodząca przez $M$ przecina $\Gamma_1$ ponownie w punkcie $C$ oraz $\Gamma_2$ ponownie w punkcie $D$. Proste $CA$ i $DB$ przecinają się w punkcie $E$; proste $AN$ i $CD$ przecinają się w punkcie $P$; proste $BN$ i $CD$ przecinają się w punkcie $Q$. Wykazać, że $EP=EQ$.

**2.** Niech $a$, $b$, $c$ będą takimi liczbami rzeczywistymi dodatnimi, że $abc=1$. Udowodnić, że

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right)\leqslant 1\,.$$

**3.** Niech $n\geqslant 2$ będzie liczbą naturalną. Na danej poziomej prostej znajduje się $n$ pcheł, nie wszystkie w tym samym punkcie. Dla liczby rzeczywistej dodatniej $\lambda$ definiujemy *ruch* następująco:

(i) wybieramy dwie pchły, w punktach $A$ i $B$, przy czym $A$ znajduje się na lewo od $B$;

(ii) pchła z punktu $A$ skacze na punkt $C$, znajdujący się na danej prostej na prawo od $B$ i taki, że $BC/AB=\lambda$.

Wyznaczyć wszystkie takie wartości $\lambda$, że dla dowolnego punktu $M$ na prostej i dowolnego początkowego położenia $n$ pcheł istnieje skończony ciąg ruchów, który przeprowadza wszystkie pchły na prawo od $M$.

**4.** Iluzjonista ma sto kart ponumerowanych od 1 do 100. Wkłada je do trzech pudełek, czerwonego, białego i niebieskiego tak, że każde z nich zawiera przynajmniej jedną kartę. Ktoś z widzów wybiera dwa z tych trzech pudełek, wyciąga po jednej karcie z każdego z wybranych pudełek i podaje sumę liczb na wyciągniętych kartach. Mając daną tę sumę, iluzjonista wskazuje to pudełko, z którego nie została wyciągnięta żadna karta.

Na ile sposobów można włożyć wszystkie karty do pudełek tak, by ta sztuka zawsze się udała? (Dwa sposoby uważa się za różne, gdy przynajmniej jedna karta znajdzie się za każdym razem w innym pudełku).

**5.** Rozstrzygnąć, czy istnieje taka liczba całkowita dodatnia $n$, że

(i) $n$ jest podzielna przez dokładnie 2000 różnych liczb pierwszych oraz

(ii) liczba $2^n+1$ jest podzielna przez $n$.

**6.** Niech $AH_1$, $BH_2$, $CH_3$ będą wysokościami trójkąta ostrokątnego $ABC$. Okrąg wpisany w trójkąt $ABC$ jest styczny do $BC$, $CA$, $AB$ odpowiednio w punktach $T_1$, $T_2$, $T_3$. Niech proste $l_1$, $l_2$, $l_3$ będą symetrycznymi obrazami prostych $H_2H_3$, $H_3H_1$, $H_1H_2$ odpowiednio względem prostych $T_2T_3$, $T_3T_1$, $T_1T_2$. Udowodnić, że proste $l_1$, $l_2$, $l_3$ wyznaczają trójkąt, którego wierzchołki leżą na okręgu wpisanym w trójkąt $ABC$.

## Zadania z XXIII Austriacko-Polskich Zawodów Matematycznych

Baranów Sandomierski, 28–30 czerwca 2000 r.

**1.** Wyznaczyć wszystkie wielomiany $P(x)$ o współczynnikach rzeczywistych, dla których istnieje taka dodatnia liczba całkowita $n$, że dla nieskończenie wielu wartości $x$ zachodzi równość:

$$\sum_{k=1}^{2n+1}(-1)^k\left[\frac{k}{2}\right]P(x+k)=0\,.$$

**2.** W sześcianie o krawędzi długości 1, $ABCD$ jest pewną ścianą, a $CG$ krawędzią do niej prostopadłą. Okrąg $o_1$ jest wpisany w kwadrat $ABCD$, a okrąg $o_2$ jest opisany na trójkącie $BDG$. Wyznaczyć najmniejszą wartość odległości $XY$ dla $X\in o_1$ i $Y\in o_2$.

**3.** Dla każdej liczby naturalnej $n\geqslant 3$ rozwiązać w liczbach rzeczywistych następujący układ równań:

$$\begin{cases} x_1^3=x_2+x_3+1 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ x_k^3=x_{k+1}+x_{k+2}+1 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ x_{n-1}^3=x_n+x_1+1 \\ x_n^3=x_1+x_2+1 \end{cases}$$

**4.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie $N$, nie mające dzielników pierwszych różnych od 2 i 5, takie, że $N+25$ jest kwadratem liczby całkowitej.

**5.** Dla jakich liczb naturalnych $n\geqslant 5$ możliwe jest pokolorowanie wierzchołków $n$-kąta foremnego nie więcej niż sześcioma kolorami, w ten sposób, aby w każdej grupie pięciu kolejnych wierzchołków wystąpiło pięć różnych kolorów?

**6.** Rozważmy bryłę $Q$ postaci $Q=Q_0\cup Q_1\cup Q_2\cup Q_3\cup Q_4\cup Q_5\cup Q_6$, gdzie $Q_i$ $(i=0,1,2,\dots,6)$ są siedmioma różnymi sześcianami o krawędziach długości 1, przy czym sześcian $Q_0$ ma wspólną ścianę z każdym z sześciu pozostałych. Rostrzygnąć, czy można wypełnić przestrzeń nieskończoną ilością brył, z których każda powstaje przez przesunięcie równoległe bryły $Q$, a żadne dwie nie mają wspólnych punktów wewnętrznych.

**7.** Na płaszczyźnie dany jest trójkąt $A_0B_0C_0$. Rozważamy trójkąty $ABC$ spełniające następujące warunki:

(i) proste $AB$, $BC$, $CA$ przechodzą, odpowiednio, przez punkty $C_0$, $A_0$, $B_0$;

(ii) trójkąty $ABC$ i $A_0B_0C_0$ są podobne (tzn. istnieje podobieństwo przekształcające $A$ na $A_0$, $B$ na $B_0$ i $C$ na $C_0$).

Wyznaczyć miejsce geometryczne środków okręgów opisanych na wszystkich takich trójkątach $ABC$.

**8.** Na płaszczyźnie danych jest 27 punktów, z których żadne trzy nie są współliniowe. Cztery spośród tych punktów są wierzchołkami kwadratu o boku długości 1, a pozostałe 23 leżą wewnątrz tego kwadratu. Udowodnić, że pewne trzy spośród danych punktów są wierzchołkami trójkąta o polu nie większym niż $\frac{1}{48}$.

**9.** Udowodnić, że jeśli $a$, $b$, $c$ są nieujemnymi liczbami rzeczywistymi, przy czym $a+b+c=1$, to mają miejsce nierówności:

$$2 \leqslant \left(1-a^2\right)^2 + \left(1-b^2\right)^2 + \left(1-c^2\right)^2 \leqslant (1+a)(1+b)(1+c)\,.$$

Dla każdej z tych nierówności rozstrzygnąć, kiedy zachodzi równość.

**10.** Plan zamku w Baranowie Sandomierskim można w przybliżeniu przedstawić jako graf o 16 węzłach, narysowany poniżej:



Nocny strażnik planuje zamkniętą trasę obchodu wzdłuż krawędzi tego grafu.

(a) Ile istnieje takich tras (bez uwzględniania kierunku), które przechodzą przez każdy węzeł dokładnie raz?

(b) Ile istnieje takich tras (z uwzględnieniem kierunku), które przechodzą przez każdą krawędź dokładnie raz i nie krzyżują się same ze sobą?

### Zadania z XI Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich

Oslo (Norwegia), 4 listopada 2000 r.

**1.** Niech $K$ będzie punktem leżącym wewnątrz trójkąta $ABC$. Niech $M$ i $N$ będą takimi punktami, że $M$ i $K$ leżą po przeciwnych stronach prostej $AB$, oraz $N$ i $K$ leżą po przeciwnych stronach prostej $BC$. Załóżmy, że $\sphericalangle MAB = \sphericalangle MBA = \sphericalangle NBC = \sphericalangle NCB = \sphericalangle KAC = \sphericalangle KCA$. Udowodnić, że $MBNK$ jest równoległobokiem.

**2.** Dany jest trójkąt równoramienny $ABC$ o kącie $\sphericalangle A = 90°$. Niech $M$ będzie środkiem boku $AB$. Prosta przechodząca przez punkt $A$ i prostopadła do prostej $CM$ przecina bok $BC$ w punkcie $P$. Dowieść, że

$$\sphericalangle AMC = \sphericalangle BMP.$$

**3.** Dany jest trójkąt $ABC$, w którym $\sphericalangle A = 90°$ oraz $AB \neq AC$. Punkty $D$, $E$, $F$ leżą odpowiednio na bokach $BC$, $CA$, $AB$, w taki sposób, że $AFDE$ jest kwadratem. Wykazać, że prosta $BC$, prosta $FE$ oraz styczna w punkcie $A$ do okręgu opisanego na trójkącie $ABC$ przecinają się w jednym punkcie.

**4.** Dany jest trójkąt $ABC$, w którym $\sphericalangle A = 120°$. Punkty $K$ i $L$ leżą odpowiednio na bokach $AB$ i $AC$. Niech $BKP$ i $CLQ$ będą trójkątami równobocznymi zbudowanymi na zewnątrz trójkąta $ABC$. Udowodnić, że $PQ \geqslant \frac{\sqrt{3}}{2}(AB+AC)$.

**5.** Niech $ABC$ będzie takim trójkątem, że
$$\frac{BC}{AB-BC}=\frac{AB+BC}{AC}.$$
Wyznaczyć iloraz $\sphericalangle A:\sphericalangle C$.

**6.** Fredek prowadzi pensjonat. Twierdzi on, że za każdym razem, gdy jego pensjonat odwiedza $n\geqslant 3$ gości, potrafi wskazać takich dwóch, którzy wśród pozostałych gości mają taką samą liczbę znajomych oraz wspólnego znajomego lub wspólnego nieznajomego. Dla jakich wartości $n$ Fredek ma rację?

**7.** Tablica kontrolna o wymiarach $40\times 50$ składa się 2000 guzików, z których każdy jest w pozycji: włączony lub wyłączony. Naciśnięcie guzika powoduje zmianę jego pozycji oraz pozycji wszystkich guzików w tej samej kolumnie i w tym samym wierszu. Wykazać, że przyciskając guziki można tablicę z początkowo wyłączonymi guzikami doprowadzić do tablicy, w której wszystkie guziki są włączone. Wyznaczyć najmniejszą potrzebną do tego liczbę naciśnięć.

**8.** Na przyjęciu spotkało się czternastu kolegów. Jeden z nich, Fredek, chciał wcześniej położyć się spać. Pożegnał się więc z 10 kolegami, zapominając o trzech pozostałych i poszedł spać. Po chwili wrócił na przyjęcie, pożegnał się z 10 kolegami (niekoniecznie tymi samymi co poprzednio) i poszedł spać. Fredek powracał jeszcze wielokrotnie i za każdym razem żegnał się z 10 kolegami, po czym szedł spać. Kiedy tylko pożegnał się z każdym ze swoich kolegów co najmniej raz, to już nie wrócił. Rano Fredek uświadomił sobie, że z każdym z trzynastu kolegów pożegnał się inną liczbę razy. Ile co najmniej razy powracał Fredek?

**9.** Po szachownicy $2k\times 2k$ złożonej z jednostkowych kwadratów skacze żaba. Skoki żaby są długości $\sqrt{1+k^2}$ i przenoszą ją ze środka jednego kwadratu do środka innego kwadratu. Pewnych $m$ kwadratów szachownicy zaznaczono krzyżykiem. Wszystkie kwadraty, do których może skoczyć żaba z pól oznaczonych krzyżykiem, oznaczono kółkiem (nawet, jeśli na którymś z tych pól jest już krzyżyk). Kółkiem oznaczono $n$ kwadratów. Dowieść, że $n\geqslant m$.

**10.** Na tablicy napisano dwie liczby całkowite dodatnie. Początkowo, jedna z nich jest równa 2000, a druga jest mniejsza niż 2000. Jeśli średnia arytmetyczna $m$ dwóch liczb napisanych na tablicy jest liczbą całkowitą, możemy wykonać następującą procedurę: ścieramy jedną z liczb zastępując ją przez $m$. Dowieść, że ta procedura nie może być wykonana więcej niż dziesięć razy. Podać przykład, w którym powyższa procedura jest wykonywana dziesięć razy.

**11.** Dany jest taki ciąg liczb całkowitych dodatnich $a_1,a_2,\dots$, że dla dowolnych $m$ i $n$ zachodzi: jeśli $m$ jest dzielnikiem liczby $n$ oraz $m<n$, to $a_m$

jest dzielnikiem liczby $a_n$ oraz $a_m < a_n$. Znaleźć najmniejszą możliwą wartość liczby $a_{2000}$.

**12.** Niech $x_1,x_2,\ldots,x_n$ będą takimi liczbami całkowitymi dodatnimi, że żadna z nich nie jest początkowym fragmentem żadnej innej (na przykład 12 jest początkowym fragmentem liczb $\underline{12}$, $\underline{12}5$ oraz $\underline{12}405$). Dowieść, że

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}<3.$$

**13.** Niech $a_1,a_2,\ldots,a_n$ będzie takim ciągiem arytmetycznym liczb całkowitych, że $i \mid a_i$ dla $i=1,2,\ldots,n-1$ oraz $n \nmid a_n$. Udowodnić, że $n$ jest potęgą liczby pierwszej.

**14.** Znaleźć wszystkie takie dodatnie liczby całkowite $n$, że $n$ równa się liczbie dodatnich dzielników liczby $n$ pomnożonej przez 100.

**15.** Niech $n$ będzie dodatnią liczbą całkowitą niepodzielną ani przez 2, ani przez 3. Wykazać, że dla wszystkich liczb całkowitych $k$ liczba

$$(k+1)^n-k^n-1$$

jest podzielna przez $k^2+k+1$.

**16.** Udowodnić, że dla wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych $a$, $b$, $c$ zachodzi nierówność

$$\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}\geqslant\sqrt{a^2+ac+c^2}.$$

**17.** Znaleźć wszystkie rozwiązania w liczbach rzeczywistych następującego układu równań:

$$\begin{cases} x+y+z+t=5\\ xy+yz+zt+tx=4\\ xyz+yzt+ztx+txy=3\\ xyzt=-1. \end{cases}$$

**18.** Wyznaczyć wszystkie dodatnie liczby rzeczywiste $x$ i $y$ spełniające równanie

$$x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+4=2\cdot(\sqrt{2x+1}+\sqrt{2y+1}).$$

**19.** Niech $t\geqslant\frac{1}{2}$ będzie liczbą rzeczywistą, a $n$ dodatnią liczbą całkowitą. Dowieść, że $t^{2n}\geqslant(t-1)^{2n}+(2t-1)^n$.

**20.** Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej $n$, niech

$$x_n=\frac{(2n+1)(2n+3)\cdot\ldots\cdot(4n-1)(4n+1)}{(2n)(2n+2)\cdot\ldots\cdot(4n-2)(4n)}.$$

Dowieść, że

$$\frac{1}{4n}<x_n-\sqrt{2}<\frac{2}{n}.$$